

# Paracetamolio 10 mg/ml infuzinio tirpalo dozavimas

Vaistų vartojimo klaidų, galinčių sukelti atsitiktinį perdozavimą, rizika

Skiriant ir vartojant paracetamolio 10 mg/ml infuzinį tirpalą, būtina elgtis itin atsargiai, siekiant išvengti **dozavimo klaidų dėl painingos tarp miligramų (mg) ir mililitrų (ml), nes tai gali sukelti atsitiktinį perdozavimą ar net mirtį**. Išrašant receptus, būtina nurodyti **ties dozę miligramais, tiek jai atitinkantį tūrį mililitrais. Dozė ir tūris priklauso nuo paciento kūno svorio**.

## Terapinės indikacijos

Taip pat pasitaikė klaidų, susijusių su atsitiktiniu perdozavimu suaugusiesiems, kurių kūno svoris  $\leq 50$  kg (jiems taikomas kūno svoriu pagrįstas dozavimas – 60 mg/kg, neviršijant 3 g), dėl kurių išsivystė sunkus hepatotoksiškumas. Trumpalaikis vidutinio stiprumo skausmo gydymas, ypač po chirurginių operacijų, ir karščiavimo mažinimas. Taip pat prašome vadovautis Paracetamolio 10 mg/ml infuzinio tirpalo preparato charakteristikų santrauka (PCS).

	Išnešiotiems naujagimiams, kūdikiams ir mažiems vaikams, sveriantiems iki 10 kg	Mažiems vaikams ir vaikams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 33 kg	Vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, sveriantiems daugiau kaip 33 kg ir iki 50 kg	Vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, sveriantiems daugiau kaip 50 kg, neturintiems papildomų hepatotoksiškumo rizikos veiksnių	Vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, sveriantiems daugiau kaip 50 kg, turintiems papildomų hepatotoksiškumo rizikos veiksnių (žr. PCS)
Dozė vienkartinio vartojimo metu	7,5 mg/kg	15 mg/kg	15 mg/kg	1000 mg	1000 mg
Tūris vienkartinio vartojimo metu	0,75 ml/kg	1,5 ml/kg	1,5 ml/kg	100 ml	100 ml
Maksimali paros dozė	30 mg/kg (atitinka 3 ml/kg)	60 mg/kg (atitinka 6 ml/kg)	60 mg/kg (atitinka 6 ml/kg)	4000 mg (atitinka 400 ml)	3000 mg (atitinka 300 ml)
Atitikimas pakuotėms	10 ml ampulė (jei neprieinama: 50 ml Ecoflac buteliukas)	50 ml Ecoflac buteliukas	100 ml Ecoflac buteliukas		

Tirpalas skiriamas kaip 15 minučių intraveninė infuzija. Intervalas tarp kiekvieno vartojimo turi būti ne mažesnis kaip 4 valandos. **Per 24 valandas** negalima skirti daugiau kaip 4 dozių.

Pacientams, **sergantiems sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu**, atsižvelgiama į informaciją, pateiktą PCS. Nurodyta **maksimali paros dozė taikoma tik pacientams, kurie nevartoja kitų paracetamolio turinčių preparatų**. Daugiau informacijos apie vaisto nutraukimą, skiedimą ir infuziją galima rasti PCS ir pakuotės lapelyje.

# Paracetamolio 10 mg/ml infuzinio tirpalo dozavimas

Specialios instrukcijos išnešiotiems naujagimiams, kūdikiams ir mažiems vaikams, sveriantiems iki 10 kg

## 1 ml infuzinio tirpalo sudėtyje yra 10 mg paracetamolio.

Dozė vienkartinio vartojimo metu: 7,5 mg/kg, atitinka 0,75 ml/kg kūno svorio. Reikalingas tūris gali būti labai mažas. Pavyzdžius žr. lentelėje. **Vienkartinio vartojimo tūris niekada neturėtų viršyti 7,5 ml. Maksimali paros dozė yra 30 mg/kg (atitinka 3 ml/kg).**

**Originalaus ecoflac buteliuko negalima naudoti tiesiogiai infuzijai.**

Tūris, skirtas vartoti, turi būti ištrauktas iš ecoflac buteliuko ir ištirpintas 9 mg/ml (0,9%) natrio chlorido tirpale arba 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpale santykiu 1:10 (1 tūris paracetamolio 10 mg/ml infuzinio tirpalo į 9 tūrius skiediklio). Dozės išmatavimui reikia naudoti **5 arba 10 ml švirkštą**. Galima naudoti ir **švirkšto pompą**.

Per 24 valandas negalima skirti daugiau kaip 4 dozių.

Paciento svoris	Dozė vienkartinio vartojimo metu	Tūris vienkartinio vartojimo metu
3 kg	22 mg	2,2 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml
5 kg	37 mg	3,7 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml
7 kg	52 mg	5,2 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml
9 kg	67 mg	6,7 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml

Mokomoji medžiaga, oficialiai patvirtinta Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos

Jei turite papildomų klausimų, prašome susisiekti su:

UAB B.Braun Medical

Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva

Telefono Nr.: +370 237 4 333, Fax: +370 237 4 344

El. Paštas: [pharmacovigilance.lt@bbraun.com](mailto:pharmacovigilance.lt@bbraun.com)